

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 21 al 27 d'abril de 2025.

Al llarg de la setmana ha predominat un mantell encrostat superficialment, a primeres hores del dia, i humit en les seves capes més internes. El regel nocturn i de la matinada desapareix ràpidament amb el pas de les hores, amb el predomini del procés típic primaveral de la fusió-regel.

El pas d'un front poc actiu a inici de setmana deixa neu a cotes superiors als 2.200 m, amb una ambient molt suau. Dimecres, dia 23, al Pirineu oriental i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró cau una lleu una enfarinada amb cota a partir dels 2.100 m. La neu recent és humida a partir dels 2.100 m, a totes les orientacions.


Durant el cap de setmana passa un front i els xàfecs deixen una nevada feble a l'Aran-Franja Nord Pallaresa, al Ter-Freser i al Prepirineu (de 5 a 10 cm), amb una cota que baixa, puntualment, fins als 2.200 m. A la Franja Nord Pallaresa, per sobre dels 1850 m fins als 2.400 m, trobem neu primavera estovada per la pluja a totes les orientacions. Apareixen símptomes d'aquests xàfecs amb pluja, amb presència de solcs i conques des dels 1.900 m fins al cim.

Durant la circulació pel terreny amb esquís de muntanya trobem el mantell encrostat -no portant- a primera hora, ja humitejat, i puntualment i, de forma testimonial, alguna crosta encara resistent a primera hora. Aquestes crostes, però, s'humitegen ràpidament amb el pas de les hores. S'observa la caiguda de boles a les solanes per damunt dels 2.100 m, així com enfonsament de l'esquí fins al turmell. Hi ha presència de neu discontinua a partir dels 1.800 m, per exemple, a l'Aran-Franja Nord Pallaresa, guanyant continuïtat a partir dels 2.000 m a les obagues, i per damunt dels 2.300 m a les solanes.

A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la Pallaresa trobem neu a terra per sobre de 1.900 en orientacions nord i de 2.100 m en sud. A uns 2.300 m els gruixos volten els 80-120 cm i es troben una mica per sota dels valors normals per a l'època. A la Ribagorçana-Vall Fosca, a uns 2.500 m, els gruixos volten els 150 cm i sobre els 110 cm a la Pallaresa. Al Ter-Freser, a 2.400 m, hi ha uns 60-80 cm de gruix total i són superiors als normals per a l'època de l'any. Al Vessant Nord del Cadí-Moixeró freguen els 80 cm a 2.300 m i els gruixos són els normals per a l'època.

Pel que fa a activitat s'observen, dilluns 21, la caiguda de plaques humides, naturals, de mida mitjana al Còth deth Horo i Malh dera Artiga (Aran) i a la Peulha (Franja Nord Pallaresa). Durant el cap de setmana cauen purgues naturals (petites) a la Ribagorçana-Vall Fosca i també al Moixeró.

Amb la nevada del cap de setmana, el grau de perill puja a Moderat (2) - Marcat (3), per damunt dels 2.400 m, a l'Aran-Franja Nord-Pallaresa i al Ter-Freser, per problemes amb la neu humida i les plaques de vent. A la resta de sectors es manté en Moderat (2).



Evolució del gruix de neu a terra a l'estació de Port del Comte (Prepirineu), a 2.290 m. S'observa un ascens del gruix, dissabte, de 10 cm de neu nova, a causa dels xàfecs amb cota de neu fins als 2.200 m.



Allaus naturals de neu recent (humida), de mida petita, a la Pica Cervi (Ribagorçana), el 21 d'abril.



Mantell continu, amb neu humida, camí del coll de la Barra (Perafita-Puigpedrós), el 22 d'abril.



Boles i purgues naturals de neu humida, de mida petita, el 23 d'abril, a Boí-Taüll (Ribagorçana).



Mantell vell, amb neu humida i crostes marrons aflorant en superfície, el 25 d'abril, a Espot-Brusseres.


Pirineu de Catalunya



PERFIL DEL MANTELL NIVAL

Codi:

4



Perfil i sondeig realitzats a Portainé (Pallaresa), a un vessant nord-est, a 2.255 m, el 26 d'abril. En superfície, els xàfecs recents deixen una fina capa de neu granulada i neu humida, damunt d'un crosta. Per sota, entre altres crostes degradades apareix una mantell humit en la seva totalitat.