

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana del 10 al 16 de novembre de 2025

Les nevades de la setmana anterior van acumular al voltant de 30 cm de neu a cota alta a l'Aran-Franja Nord Pallaresa. Aquesta neu va caure damunt d'un terra nu i la neu de cotes més baixes va desaparèixer ràpidament. No obstant això, a inici de setmana encara s'observava neu contínua per damunt dels 1.800 m, sobretot a obagues. A solanes apareixien algunes discontinuïtats a causa de la fusió. Amb l'acció del vent del Nord-oest i la posterior compactació del mantell per l'ascens tèrmic els gruixos van quedar al voltant dels 15 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.


L'estructura del mantell nival estava dominada per un encrostament en superfície, a causa de la fusió-regel i, per sota, apareixien grans fins i formes mixtes, amb una altra crosta fins a la base. Per damunt dels 2.100 m hi havien sobreacumulacions al voltant dels 30 cm. No obstant això, el mantell encara no era esquiable a causa de l'aflorament de pedres i blocs. Només trobàvem més continuïtat a cubetes i conques.

El transport efectiu pel vent va redistribuir la neu, sobretot a la Franja Nord Pallaresa, però també sota carenes del Ter-Freser, de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vall Fosca amb presència de sobreacumulacions a orientacions arrecerades, sobretot a S, E i SE. S'observaven deflacions a alguns lloms i també alguna cornisa i la caiguda de boles a les solanes.

A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, a inici de setmana, trobem al voltant de 15 cm de neu a cota alta. Aquesta neu reposa damunt d'un terra nu i la neu de cotes més baixes ha anat desaparèixer ràpidament. No obstant això, encara trobem neu contínua a obagues per damunt dels 2.000 m. A solanes apareixen discontinuïtats a causa de la fusió i el mantell és més testimonial. Al Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró trobem prop de 10 cm de neu a cota alta, a obagues. A solanes la neu ha desaparegut a causa de la fusió i és testimonial a cota alta.

Entre el divendres i el cap de setmana les precipitacions en forma de pluja fins els 2.700 m, acompanyada de fang, van fer minvar el mantell existent a tot el Pirineu. Per exemple, a l'Aran-Franja Nord Pallaresa trobem neu contínua per damunt dels 2.000 m a obagues. A solanes apareixen discontinuïtats a causa de la fusió fins a la mateixa línia de cims. La posterior baixada de la cota de neu va enfarinar, de nou, el paisatge i es van acumular de 10 a 15 cm per damunt dels 2.400 m a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.

Amb la pujada de la cota de neu de divendres 14 es calcula la possible fusió de la neu a causa de la pluja. Amb les dades disponibles de neu a cota alta, s'arriba a la conclusió que la fusió a causa de l'aigua precipitada damunt del mantell ha estat d'entre 7 i 14 cm, que equival a uns 30 mm afegits a la pluja prevista, aproximadament.



Evolució del gruix de neu a terra entre el dia 10 i el 16 de novembre, a l'estació d'Espot, a 2.519 m. Entre el divendres i el diumenge de matinada s'acumulen fins a 15 cm de neu nova.



Distribució del mantell nival al Port de Tavascan, a 2.100 m (Franja Nord Pallaresa), dimarts, dia 11. El mantell és continu però amb molt poc gruix.



Aspecte del Vessant Nord del Cadí, des de Prat de Cadí, dimecres, dia 12. Trobem encara 14 cm a l'estació de Cadí Nord (2.143 m).



Aspecte del sector de Perafita-Puigpedrós, des del coll de la Barra, dissabte, dia 15. L'enfarinada va deixar neu a partir dels 2.400 m.



ICGC
Institut
Cartogràfic i Geològic
de Catalunya

PERFIL DEL MANTELL NIVAL

4

[illegible]

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 Parc de Montjuïc • E 08038 Barcelona
 Tel. +34 93 567 15 00 • Fax +34 93 567 15 67
www.icgc.cat • icgc@icgc.cat