

Resumen nivológico semanal

Síntesis de la semana del 10 al 16 de noviembre de 2025

Las nevadas de la semana anterior acumularon alrededor de 30 cm de nieve en cotas altas en Aran-Franja Nord Pallaresa. Esta nieve cayó sobre un suelo desnudo y la nieve de cotas más bajas desapareció rápidamente. No obstante, a comienzos de semana todavía se observaba nieve continua por encima de los 1.800 m, sobre todo en umbrías. En solanas aparecían algunas discontinuidades debido a la fusión. Con la acción del viento del noroeste y la posterior compactación del manto por el ascenso térmico, los espesores quedaron alrededor de los 15 cm en Aran-Franja Nord Pallaresa.


La estructura del manto nival estaba dominada por una costra en superficie, debido a la fusión-rehielo, y por debajo aparecían granos finos y formas mixtas, con otra costra hasta la base. Por encima de los 2.100 m había sobreacumulaciones alrededor de los 30 cm. No obstante, el manto aún no era esquiable debido al afloramiento de piedras y bloques. Solo encontrábamos más continuidad en cubetas y cuencas.

El transporte efectivo por el viento redistribuyó la nieve, sobre todo en la Franja Nord de la Pallaresa, pero también bajo crestas del Ter-Freser, de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca, con presencia de sobreacumulaciones en orientaciones resguardadas, sobre todo en S, E y SE. Se observaban deflaciones en algunos lomos y también alguna cornisa y la caída de bolas en las solanas.

En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, a comienzos de semana, encontramos alrededor de 15 cm de nieve en cotas altas. Esta nieve descansa sobre un suelo desnudo y la nieve de cotas más bajas ha ido desapareciendo rápidamente. No obstante, todavía encontramos nieve continua en umbrías por encima de los 2.000 m. En solanas aparecen discontinuidades debido a la fusión y el manto es más testimonial. En el Perafita-Puigpedrós y en la Vessant Nord del Cadí-Moixeró encontramos cerca de 10 cm de nieve en cotas altas, en umbrías. En solanas la nieve ha desaparecido debido a la fusión y es testimonial en cotas altas.

Entre el viernes y el fin de semana, las precipitaciones en forma de lluvia hasta los 2.700 m, acompañadas de barro, hicieron disminuir el manto existente en todo el Pirineo. Por ejemplo, en el Aran-Franja Nord Pallaresa encontramos nieve continua por encima de los 2.000 m en umbrías. En solanas aparecen discontinuidades debido a la fusión hasta la misma línea de cumbres. El posterior descenso de la cota de nieve volvió a blanquear el paisaje y se acumularon entre 10 y 15 cm por encima de los 2.400 m en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

Con la subida de la cota de nieve del viernes 14 se calcula la posible fusión de la nieve debido a la lluvia. Con los datos disponibles de nieve en cotas altas, se llega a la conclusión de que la fusión causada por el agua precipitada sobre el manto ha sido de entre 7 y 14 cm, lo que equivale a unos 30 mm añadidos a la lluvia prevista, aproximadamente.




Evolució del espesor de nieve en el suelo entre el día 10 y el 16 de noviembre, en la estación de Espot, a 2.519 m. Entre el viernes y la madrugada del domingo se acumulan hasta 15 cm de nieve nueva.



Distribución del manto nival en el Puerto de Tavascan, a 2.100 m (Franja Nord Pallaresa), martes, día 11. El manto es continuo pero con muy poco espesor.



Aspecto de la Vessant Nord del Cadí, desde Prat de Cadí, miércoles, día 12. Todavía encontramos 14 cm en la estación de Cadí Nord (2.143 m).



Aspecto del sector de Perafita-Puigpedrós, desde el coll de la Barra, sábado, día 15. La nevada ligera dejó nieve a partir de los 2.400 m.

ICGC
Institut
Cartogràfic i Geològic
de Catalunya

PERFIL DEL MANTELL NIVAL

4

[illegible]

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 Parc de Montjuïc • E 08038 Barcelona
 Tel. +34 93 567 15 00 • Fax +34 93 567 15 67
 www.icgc.cat • icgc@icgc.cat