

Resumen nivológico semanal

Síntesis de la semana del 1 al 7 de diciembre de 2025

La semana se caracteriza por un pequeño frente atlántico que cruza hacia el jueves y viernes. Habrá cielos despejados los primeros y últimos días, pero con variaciones en la estabilidad del manto de nieve.

El manto de nieve de lunes y martes, previo a la nevada, era de unos 40 cm en la Franja Nord Pallaresa a cotas altas y protegidas del viento. La nieve estaba presente desde cotas bajas gracias a las nevadas de días anteriores, pero con un grosor muy escaso.

El manto estaba compuesto por una capa débil y persistente, difícil de identificar, que generaba cierta inestabilidad. En la cara norte de la Pallaresa, la acción del viento generó situaciones de nieve ventada que provocaron algunas avalanchas.

Con el paso del frente, cayeron unos 10 cm de nieve nueva el martes y 5 más el miércoles en la Franja Nord, en la Pallaresa. El grosor del manto pasó de 33 cm a 48 cm en la estación de Certascan, acompañado de viento y temperaturas medias de -8 °C.


En el resto del Pirineo, la nevada de mitad de semana no llega o tiene muy poco impacto. Por lo tanto, los espesores se mantienen bajos durante toda la semana, con acumulaciones puntuales en lugares resguardados o a sotavento, zonas que a menudo tienen más grosor que las cumbres y las crestas, barridas por el viento.

La nieve en cotas bajas de las semanas anteriores se va deshaciendo progresivamente durante la semana. El resto de sectores siguen en una mala situación nivológica debido a la falta de un manto continuo.


De cara al final de la semana, el manto presenta claros signos de inestabilidad debido a la nieve nueva añadida, que tiene un mal contacto con el manto anterior, y a la acción del viento en la Franja Nord de la Pallaresa. Se observan avalanchas de tamaño 1 y 2 (media, con capacidad de enterrar a una persona) de nieve reciente en el Valle de Arán, y avalanchas de tamaño 1 (tamaño fatal en terreno trampa) de placa de viento en la Pallaresa.

Los test realizados en esta zona el viernes 5 de diciembre fueron positivos en el test de columna y en el de columna extendida al primer golpe (muy reactivos) y ambos en la misma capa. El test de columna extendida no propagó y los test de la sierra mostraban una ruptura total de la capa alrededor del 85-90%.

Todo esto indicaba una estabilidad pobre o muy pobre del manto, con posibilidad de generar avalanchas de hasta tamaño 2.



Evolució del grosor de nieve en el suelo entre el día 1 y el 7 de diciembre, en la estación de Certascan, a 2.400 m. El miércoles y jueves cae una nevada que acumula unos 15 cm, pero el sol y el viento hacen disminuir el grosor rápidamente.



Estado del manto de nieve el martes 2 de diciembre en Tavascan (Franja Nord de la Pallaresa) antes de la nevada. El manto era poco profundo, pero estaba presente en todas las orientaciones a cotas medias y altas.



Avalancha de placa de viento, accidental, el día 1 de diciembre en el Pico de Parros, Naut Aran (Aran), con 1 persona arrastrada. Imagen: Boi Sagarra.



Estado del manto de nieve en Guerossos, en el municipio de Lladorre (Franja Nord de la Pallaresa). Se puede ver un manto continuo pero escaso, y las zonas altas con falta de nieve debido al fuerte viento de las semanas anteriores.

ICGC
Institut
Cartogràfic i Geològic
de Catalunya

Codi:

4

[illegible]

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 Parc de Montjuïc • E 08038 Barcelona
 Tel. +34 93 567 15 00 • Fax +34 93 567 15 67
www.icgc.cat • icgc@icgc.cat