

Resum nivològic setmanal

Síntesi de la setmana de l'11 al 17 de maig de 2026

L'arribada de fronts han deixat precipitacions en forma de neu però tot i aquesta petita aportació de neu recent (5-10 cm), el mantell, en conjunt, continua humit. Damunt del mantell vell, la neu recent, acompanyada d'una mica de vent en moments de xàfecs, ha generat alguna placa de vent sota colls i carenes, especialment en orientacions NE, E i S. Les condicions, amb l'arribada dels solcs d'aire fred, han estat hivernals, amb valors al voltant dels -6 °C i -8 °C, a 2.400 m, durant la matinada de dimecres i de dissabte.



Evolució de la temperatura al llarg de la setmana a Certscan (Franja Nord Pallaresa), a 2.400 m.

En general, els gruixos estan reculant ràpidament, així com el regel de la neu antiga que estabilitza el mantell.


Pel que fa al mantell nival, es troba format de forma pràcticament exclusiva per gra de fusió i per algunes crostes, amb presència d'una mica de neu recent i neu granulada en la part més superficial.

El grau de perill ha estat Moderat (2) per damunt de 2.300 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i Moderat (2) per damunt dels 2.400 m al Ter-Freser. A la resta del Pirineu el grau és Feble (1), Moderat (2) als extrems nord de la Pallaresa, la Ribagorçana-Vall Fosca i del Perafita-Puigpedrós.


Pel que fa activitat, destaca la caiguda d'una allau de neu humida, de mida 3 (gran), a Noarre (Franja Nord Pallaresa), el dia 12.

Els gruixos de neu, que han estat excedentaris bona part de la temporada, ara ja són deficitaris a tota la serralada, excepte a l'Aran-Franja Nord Pallaresa que són els normals

per aquestes dates i al Vessant Nord del Cadí, on són excedentaris. El gruix total de neu a terra es mou al voltant des 60-70 cm a la Franja Nord Pallaresa i està per sota a l'Aran. Al Vessant Nord del Cadí, a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca es mou sobre els 40 cm a 2.200 m.



Gruix de neu total a terra al llarg de tota la temporada a l'estació de Certascan (Franja Nord Pallaresa), a 2.400 m. Al final de la gràfica s'observa un lleu ascens associat als 5-10 cm acumulats durant aquesta setmana. Els gruixos es troben, actualment, dins del normal per aquestes dates.



Distribució del mantell al sector de la Bonaigua (Franja Nord Pallaresa), el dia 11 de maig. El mantell és més continu per damunt dels 2.300 m a obagues.



Aspecte del mantell a Tavascan, el 12 de maig. Apareix la neu vella, primavera, amb restes d'un lliscament basal antic, a un vessant orientat a l'est.



Allau de lliscament basal observat el 16 de maig al pla de Sallent, al camí de Fontalba (Núria). L'allau és de dies enrere.



Detall del lliscament basal del pla de Sallent. L'allau és de mida 2 (mitjana), amb capacitat de cobrir una persona.



PERFIL DEL MANTELL NIVAL

4

[illegible]

Perfil estratigràfic i sondeig penetromètric realitzat a Tavascan, a 2.240 m, el 12 de maig. El mantell ha reculat molt i només trobem gra de fusió, fins a la base, amb una crosta gruixuda en superfície.



ICGC
Institut
Cartogràfic i Geològic
de Catalunya

Codi:

4

[illegible]

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc • E 08038 Barcelona
Tel. +34 93 567 15 00 • Fax +34 93 567 15 67
www.icgc.cat • icgc@icgc.cat