Mapa geològic de Catalunya 1:25 000

Amer 295-1-2 (75-24)

MOSTRA GRATUÏTA A BAIXA RESOLUCIÓ. Institut Cartogràfic de Catalunya – www.icgc.cat, 2015 :: Fitxer digital georeferenciat GeoPDF en Sistema de Referència ETRS89 UTM31N (posicionament dins del mapa i coordenades de les cantonades en vermell)

La malla i les coordenades en gris sobre el mapa corresponen al Sistema de referència ED50 UTM31N

Llegenda

Cenozoic

Quaternari

- **Qfa** Sorres de gra mitjà i groller, graves i gravetes amb un contingut baix en fitms. Els dipòsits són de morfologia terrossa bombada i, occasionalment poden presentar línies d'acreció de meandres. El seu grau de irregular, i assoleixen un mòdum de 2 à 3 metres. Constituïdes les barres fluvials actuals. Terrassa D. Cronològicament corresponen a dipòsits de l'Holocè actual.
- **Qtf** Graves, gravetes i sorres a la base que passen, verticalment i de forma transicional, a sorres fitmoses i argiles. La composició dels còdols és variada i poden incloure còdols volcànics. En conjunt aquests sediments són heteromètrics. I la seva base és erosiva i discordant respecte als dipòsits de la terrassa I (Qt1). El seu grau és irregular i també és entre 2 i 3 metres. Topogràficament se situa a 1-2 metres per damunt de la llera actual del riu. Corresponen a cometa de riu amb règim trenat-anastomosat. Formen la Terrassa D'. Juntamb les barres fluvials actuals (Qfa) constitueixen la terrassa inferior moderna. La seva edat és holocena.
- **Qtlla** Argiles, fitms i sorres de mida de gra mitjà i fi, que ocasionalment contenen un cert percentatge de gravetes. Aquests dipòsits són discordants i erosiu respecte als dipòsits de llera subactuals (Qsa) i es reconeixen en la majoria de torrents que solquen el lentitori compartes en el fuli. El grau d'aquests dipòsits és irregular i varia des de 0,5 fins a 2 metres. Són els dipòsits de llera dels torrents actuals. Cronològicament corresponen a l'Holocè i es correlacionen amb els dipòsits de llera fluvial (Qfa).
- **Qsa** Sorres de gra mitjà i fi amb argiles i fitms que poden englobar còdols subarrodonits i subangulosos. És seu grau pot assolir eis 4 metres. S'interpreten com a dipòsits subactuals de torrents. Cronològicament corresponen a l'Holocè i es correlacionen amb la Terrassa D' (Qtd').
- **Qtd'** Argiles i sorres fitmoses que engloben còdols i blocs subangulosos i subarrodonits. Presenten morfologies lleugerament bombades i es desenvolupen à front dels torrents. El grau d'aquests dipòsits és d'ordre mètric. Corresponen a cons de dejecció que han funcionat durant la part final del Quaternari, Holocè.
- **Qtac** Argiles amb sorres i fitms que contenen alguna còdols subangulosos i subarrodonits allats. El grau d'aquests dipòsits es molt variable, d'escala decimètrica-mètrica. Són dipòsits poligènic fruit d'una sedimentació de tipus fluviotorrencial amb aportaments laterals de col·luvions dels relleus adjacents. S'interpreten com a dipòsits à·luvials-col·luvials. Cronològicament corresponen a l'Holocè.
- **Qc** Argiles, fitms i sorres, que contenen còdols subangulosos procedents dels relleus adjacents. Són dipòsits càotics que tendeixen a suavitzar el pendent de la part inferior dels vessants. El seu grau és d'ordre mètric-decamètric. Corresponen a dipòsits col·luvials. Cronològicament s'atribueixen a l'Holocè, encara que, ocasionalment, poden arribar al Pliistocè superior.
- **Qcs** Argiles i fitms arenosos que poden presentar còdols angulosos allats. Tenen una potència d'ordre mètric i es troben recolzats en eis relleus escens. Són dipòsits de caràcter col·luvial afectats per fenòmens de solifluxió i, posteriorment, per l'acció antròpica. Afloren al nord de Sant Esteve de Llémena. Cronològicament corresponen a l'Holocè i són correlacionables amb eis dipòsits actuals.
- **Qapg** Blocs mètrics angulosos i subangulosos, amb sorres, fitms, argiles i clasts centimètrics, de composició litològica variada, que depèn de l'àrea font. El grau d'aquests dipòsits és d'ordre mètric, i estan associats als relleus terciaris. A la vall del Brugent estan relacionats amb l'escarpament de la falla d'Amer. Corresponen a esllavissades pendent amb blocs grans. Cronològicament s'atribueixen al Pliistocè superior.
- **Qt** Argiles, sorres i fitms amb algunes còdols subangulosos i subarrodonits allats. El grau d'aquests dipòsits és variable i d'ordre decimètric i mètric. Corresponen a sediments eluvials-col·luvials, fruit d'una disposició en marrtell, que solen recobrir zones planeres de terrassa fluvial. Afloren a les proximitats de la localitat d'Amer. Són d'edat holocena.
- **Qta** Argiles i fitms arenosos que presenten còdols angulosos allats. Són dipòsits de poca potència, de caràcter discontinu, situats en la base formació sobre la qual s'assenten. Solen estar afectats per processos antròpics (conreus). Corresponen a dipòsits eluvials que han sofert una degradació antròpica. Cronològicament corresponen a l'Holocè i són correlacionables amb eis dipòsits actuals.
- **Qtb** Graves amb abundant matriu sorrenca a la base, que cap a sostre passen transicionalment a fitms argiloses. La composició dels còdols és variada i poden contenir còdols volcànics. El seu grau és irregular, i és entre 2 i 3 metres. La seva cota respecte del curs actual del riu es de 3-4 metres. S'interpreten com a dipòsits torrencials de caràcter anastomosat. Formen la Terrassa I. Cronològicament corresponen al Pliistocè superior-Holocè inferior.
- **Qtb'** Argiles, sorres i fitms amb còdols subarrodonits allats o constituint nivells lenticulars. El grau d'aquests dipòsits pot arribar als 5-6 metres com a màxim. Constituïdes eis sediments de terrassa fluvial acumulats a causa del barratge de riu provocat per una colada basàltica. Aquests dipòsits estan situats per damunt de la llera actual.
  - *Qtb'-t1* Aflora a la vall del riu Brugent prop de Sant Feliu de Pallerols. La seva sedimentació és conseqüència del barratge provocat per la colada basàltica atribuïda al sistema volcànic Puig de la Codina-Traiter (Qbtc-t1). Per correlació amb aquesta colada, s'atribueix al Pliistocè.
  - *Qtb'-p1* Aquests dipòsits afloren al marge oriental del fuli. La seva sedimentació es va produir com a conseqüència del barratge provocat a la riera de Rocacorba per la colada de basaltes del volcà de Granollers de Rocacorba (Qbrc-p1). L'edat d'aquests dipòsits és pliistocena per correlació amb la colada volcànica.
- **Qcb1** Argiles i sorres fitmoses de colors marró-vermelles que engloben còdols i blocs subangulosos i subarrodonits. Aquests còdols solen presentar-se formant eveis lenticulars erosius d'escala decimètrica-mètrica. Aquests dipòsits tenen una potència d'ordre mètric, morfologia lleugerament bombada i solen presentar-se formant un conjunt allargat en unir-se diferents cons adjacents. Són cons de dejecció que varen ser funcionals al Pliistocè superior.
- **Qcb2** Argiles i sorres fitmoses de coloracions variades que engloben còdols i blocs angulosos i subarrodonits. Tenen unes característiques molt similars als materials descrits als epígrafs Qcd i Qcd2. La seva sedimentació està controlada pel barratge provocat per les colades volcàniques. Es localitzen al sector nord del riu Brugent. La seva edat és pliistocena per correlació amb la colada atribuïda al volcà del Traiter (Qbtc-t1), que neteix la vall del riu Brugent.
- **Qacb** Sorres, fitms i argiles, amb còdols allats de litologia diversa segons l'àrea font. Són dipòsits força massius en els quals es difícil reconèixer estructures sedimentàries. La seva potència és d'escala mètrica i decamètrica i s'interpreten com dipòsits d'origen mixt al·luvial-col·luvial. Cronològicament s'atribueixen al Pliistocè superior.
  - *Qacb* Argiles i sorres fitmoses que engloben còdols i blocs subangulosos i subarrodonits. Tenen una potència d'ordre mètric i decamètric. Són dipòsits mixtos de tipus al·luvial-col·luvial i lacustre-palustre. El seu origen està associat al barratge provocat pels materials volcànics à la vall del riu o del torrent on desembboquen. Presenten morfologia de glacis. A la vora de la riera de Llémena, en acostar-se a l'eix del riu soleu presentar un augment important de potència. Estan relacionats amb eis dipòsits volcànics i les colades dels volcanes de Granollers de Rocacorba (gc), del puig de la Banya del Boc (bb) i del Traiter (j/J). Se'ls atribueix en conjunt una edat pliistocena.
- **Qtv** Edificis travertínics biocontruïts amb escassa presència de sediments al·luvials. Contenen argiles de descalcificació a causa de processos de disolució i carstificació del travertí. La potència d'aquests materials és d'escala mètrica. Afloren a la vall de Cogolls. La seva edat és pliistocena-holocena.
- **Qts** Làmines de travertí que en la part frontal tendeixen a disposar-se de forma vertical i que à la part dorsal s'intercalen amb nivells de fitms arenosos i fragments tobacis. A la seva part dorsal poden tenir una potència aproximada de 3 metres, mentre que à la part frontal s'adapten à la morfologia preexistent i poden salvar desnivells de fins à 8-12 metres. S'interpreten com a travertins d'escarpament. Corresponen al Pliistocè superior-Holocè.
- **Qta** Dics travertínics biocontruïts que individualitzen estanys. Aquests estanys argiles amurit estan nèiberts per sediments al·luvials del propi torrent: fitms, sorres fines, fragments de travertí i ocasionalment, nivells de graves. La potència màxima estimada d'aquests dipòsits és de 30 metres. S'interpreten com a travertins al·luvials. La seva edat és pliistocena-holocena.
- **Qvc** Dipòsits de piroclasts heteromètrics que formen el cono volcànic. Estan constituïts per material volcànic basàltic. La mida dels components piroclàstics disminueix en funció de la distància respecte del centre d'emissió, variant des de mètrics (bombes, blocs i escòries) fins a centimètrics (lapil·li). S'interpreten com a dipòsits de caiguda formats per projecció balística dels piroclasts des de la columna eruptiva. Aquest tipus de dipòsit reflecteix activitat explosiva estromboliana. Afloren amb característiques molt similars à volcà de Sant Marc i al volcà de puig Roig. Per correlació amb la colada del volcà de Sant Marc se'ls atribueix una edat pliistocena.
- **Qvm** Dipòsits de piroclasts ben classificats constituïts per lapil·li i cendres. Es presenten estratificats en nivells centimètrics-decimètrics i sovint poc consolidats. Formen mantells que recobreixen de forma relativament uniforme la topografia. Es reconeix una distribució de fàcies en funció de la distància al centre emissor: les fàcies més proximals poden contenir bombes. En conjunt, presenten estratificació encreuada i planar. Tenen una potència d'ordre decimètric-mètric. Han estat interpretats com a dipòsits mixtos de tipus estromboliià de caràgta i d'onada piroclàstica. Es localitzen al volcà de Sant Marc. Per correlació, se'ls attribueix una edat pliistocena, per correlació amb la colada del volcà de Sant Marc.
- **Qbtc** Basalts olivínics formant colades. Presenten textura porfírica o semiporfírica i localment vacuolar, amb fenocristalls d'augita, d'olivina i de plagioclasi. La matriu està formada majoritàriament per microlits de plagioclasi, augita, olivina i minerals opacs, amb textura fluïdal o amb intercreixements. El sostre de les colades està molt altaret i fortament antropitzat (Qeb).
  - *Qbtc-un* És una colada basàltica de tipus escoriàcei i forma l'única colada emesa pel volcà Sant Marc. Té una longitud d'aproximadament 1,5 quilòmetres i una potència mitjana d'entre 5 i 6 metres. Recolzeix la colada Qbtc-ut. Les datacions donen una edat de 46.300+/- 4.000 anys. Correspon al Pliistocè superior-Holocè inferior.
  - *Qbtc-ut* Colada basàltica atribuïda al sistema volcànic Puig de la Codina-Traiter (full 295-1-1 Santa Pau). S'estén fins al capdavall del pla d'Hostoles on la potència màxima és de 36 metres, amb una potència mitjana superior a les altres colades. La part inferior té hàbit massiu i la part superior presenta hàbit escoriàcei i una potència d'entre 7 i 10 metres. Les datacions absolutes determinen una edat per a aquesta colada de 46.300+/- 4.000 anys. Correspon al Pliistocè.
- **Qbsc** Basaltes formant colades. La textura és porfírica vacuolar, amb fenocristalls d'olivina, d'augita i de plagioclasi. L'olivina sovint és idiomorfa i pot estar alterada a iddingsita o serpentina. Localment, presenta lacuna intersticial. La matriu és de gra fi, fosca, holocristal·lina, formada per microlits de plagioclasi, augita i minerals opacs. El sostre de les colades està molt alterat i fortament antropitzat (Qeb). S'attribueix al Pliistocè.
  - *Qbsc-pr* Forma l'única colada del volcà Granollers de Rocacorba (295-2-2 Canet d'Adri). Aflora a la vall de la riera de Llémena. Presenta hàbits lenticular i escoriàcei, i la potència màxima es de 4-6 metres.
- **Qbtn** Basalts olivínics que es troben formant necks. Les seves característiques petrològiques són similars a les de Qbtc. Constituïxen les restes d'un aparell volcànic desmantellat per erosió i per explotació antròpica. Aquests materials es localitzen al puig Roig i es presenten en fàcies massiva cap al NW i en fàcies de blocs cap al SE. S'attribueixen al Pliistocè per correlació amb la resta de materials volcànics de la zona.
- **Qvbc** Breteses piroclàstiques heteromètriques i compactades. Presenten un aspecte massiu i, localment, lenten ocatitza intemes. Els seus components són fragments lítics provinents del sòcol i fragments magmàtics en proporcions molt variables dins del mateix dipòsit. La granulometria dels seus components és molt variada i està entre 2 mil·límetres i 2 metres. La matriu també presenta una elevada heterogeneitat i heterometria, i varia entre mida lapil·li i cendres. La potència mitjana estimada per a aquests materials és de 4-6 m. Afloren a la vall de la riera de Llémena per sota de la colada basàltica (Qbtc-pr) i provenen del sistema volcànic de Granollers de Rocacorba. S'interpreten com a colades piroclàstiques generades per processos hidromagmàtics. Cronològicament s'atribueixen al Pliistocè.

Terciari

Paleogen

Eocè

- **EBc1** Calcàries, calcàries sorrenques, margocalcàries i margues de color blavós i gris clar, amb un marcat caràcter nodulós. El contingut en fauna és molt abundant (nummulits, discociclines, algues, corals, briozous, etc...). El contacte inferior és transicional. La unitat està incompleta i aflora a l'extrem nord-oest del full. S'interpreten com a fàcies esculloses. Són del Bartònià.
- **EBc2** Gresos blavosos de granulometria de mott fina a mitjana i en menor proporció margues i fitms blaus. L'estratificació és principalment decimètrica i mètrica. Existeix un predomini mott marcat de les ordenacions en cicles estratocreixents i granocreixents, i cada cicle oscil·la entre els 10 i els 25 metres de gruix. En general la fauna és abundant (nummulits, equínids, bivalves, discociclines, etc...), mentre que a la base la bioturbació és més intensa. El contacte inferior és net. La potència és de 220 metres. S'interpreten com a fàcies de plataforma proximal. Són del Bartònià.

Paleogen

Eocè

- **EBc1** Gresos blavosos de granulometria de mott fina a fina amb nivells intercalats de granulometria mitjana, estratificats en nivells centimètrics a mètrics. En general, són massius, mott bioturbats i contenen restes vegetals. El contingut fòssil és escàs. La glauconita es freqüent à la part baixa de la unitat, però és difícil de reconèixer. Les intercalacions de sorres de gra mitjà presenten estructures tractives de petita i mitjana escala, les quals són més abundants cap a sostre de la unitat, indicant que la unitat es progradant. Els contactes amb la unitat EBp1 són transicionals, tant a la base com lateralment. La potència és variable i oscil·la entre eis 300 i eis 350 metres. S'interpreten com a fàcies de plataforma oberta amb alguna intercalació de fàcies costaneres amb rèmpleblurnent marsal i d'onades. L'edat es Bartònià inferior.
- **EBp1** Gresos eocènics de tonalitats blanquinoses, ocres i violoses. Les característiques d'aquesta unitat són l'absència de fauna i l'abundant contingut en glauconita. Petrogràficament predominen eis grans de quars i feldspat. A grans trets, la unitat da granodecreixent cap al sostre. Es reconeixen dos tipus de fàcies amb límits transicionals entre elles i amb una disposició lateral: fàcies de gres de mitjana a fina amb nivells intercalats de granulometria entre mitjana i molt groller, de potència mètrica a decamètrica i amb estructures tractives de gran escala. El segon tipus està format per nivells de gresos de granulometria entre mott fina i mitjana amb una estratificació ben marcada d'ordre centimètric a decimètric i amb estructures tractives de mitjana i petita escala. Presenten acumulacions importants de glauconita i femci i bioturbació puntualment intensa. La base de la unitat està marcada en el sector meridional per un nivell de conderassió amb abundant glauconita, femci i bioclasts. En el sector central i septentrional la base està marcada per un canvi sobtat de fàcies i el contacte amb la unitat EL2 pot ser localment erosiu. El tram basal té una potència variable i està format per nivells mètrics de gresos grollers a mott grollers amb abundants còdols de roques metamòrfiques suportats per la matriu. Aquest conjunt es troba a l'extrem nord-est de la zona i té una potència que varia entre els 0 i els 20 metres en el sector meridional i central. Disminuït fins a 60 metres en el sector septentrional. La unitat té característiques transgressives i es disposà en un domini marí som, amb forta corrents marsals. Fm. Folgueroles, L'edat es Bartònià inferior.
- **ELb1** Gresos i argiles vermelles i, en menor proporció, conglomerats. L'estratificació és d'ordre mètric. Aquesta unitat es mes intercalada dins la unitat EL2 de forma de lacul obert vers el nord, i eis seus contactes son transicionals. En aquest fuli aflora a l'extrem nord-est. La potència en aquest sector es mott reduïda. Es tracta de fàcies fluvial progradants cap al sud. Fm. Belmunt. Cronològicament s'atribueixen al Lutecià mitjà.
- **ELb2** Gresos, margues, margocalcàries i calcàries i, en menor proporció, conglomerats. L'estratificació és d'escala centimètrica a mètrica. Al sud predominen eis materials carbonatats i al nord eis siliciclàstics. Les calcàries son granocoquinoides, riques en matriu i amb abundants bioclasts i components detítics. Eis nivells siliciclàstics tenen a grans trets una ordenació granocreixent. I ho abunden les estructures tractives tant de petita com de mitjana i gran escala. El contingut en fauna és abundant a tota la unitat, especialment representat per miliòlids i alveolines. El limit inferior d'aquesta unitat de transició i la seva potència augmenta vers el nord, de 30 metres fins a prop de 200. Es tracta de sediments dipositats en un medi delta: amb predomini de canals i de llacs costaneres, i progradant cap al sud. Fm. Biaceus. L'edat es Lutecià mitjà i superior.
- **ELb3** Margues blaves. A la base de la unitat inclouen fines intercalacions centimètriques i decimètriques de margocalcàries bleses amb eleva contingut fossilífer (nummulits, cidaris, etc...). Aquest conjunt margós es caracteritza per tenir concentracions de cristalls de gipsi part alta de la unitat està caracteritzada per tenir molts petits de marques aucoqus. El limit inferior està marcat per un nivell de conderassió i un canvi sobtat de fàcies. La potència d'aquesta unitat augmenta vers el nord, des de 100 metres fins prop de 300. S'interpreten com a fàcies de plataforma sona restringida a la part baixa, i de prodelta i front deltaic a la part superior. Fm. Banyoles. L'edat es Lutecià mitjà.
- **ELg** Calcàries bioclàstiques, calcàries sorrenques i gresos de color gris amb abundants bioclasts (nummulits). Les calcàries predominen a la part alta de la unitat i en el sector septentrional. Eis gresos son mes abundants a la part baixa de la unitat i en el sector mes meridional. Prop de Sant Esteve de Llémena s'observen intercalacions de margues i margocalcàries i eis gresos. El contingut fòssil està representat a la part baixa de la unitat per miliòlids i restes vegetals en menor proporció oèntrdis i algues. A uns 50 m de la base fa ha un nivell riu en alveolines. Per sobre d'aquest nivell augmenta el contingut en nummulits que passen a constituir l'element taxònòlic mes important. També contenen fragments d'equínids i de bivalves. El component detrític mes important ès el quars mott poc rodat. En eis gresos predomina la granulometria entre mitjana i mott groller. El limit superior de la unitat es transició es produeix d'una manera dràstica à través d'un tram siliciclàstic de 5-6 m de gruix amb gresos, fèmic i argiles de colors ocres, vermells i blaus; a sostre fa freqüent l'existència d'una crosta ferruginosa que s'interpreta com una superfície transgressiva. La unitat es mes pregona a la part superior, i les fàcies mes distals afloren en posicions mes septentrionals. La potència d'aquesta unitat es de 150 m. S'interpreten com a fàcies de plataforma carbonatada amb influència detrítica. Fm. Tavertet i Girona. L'edat es Lutecià inferior i mitjà.

Paleocè - Eocè

- **PEp** Gresos, fitms i argiles vermelles bioturbades amb nivells canaliformes de gresos i conglomerats intraformifàcies, de color vermelles i gris blanquinós. L'estratificació es decimètrica a mètrica. Eis gresos son immaduts, especialment a la base de la unitat. Eis còdols son predominantment de roques metamòrfiques i quars, i en menor proporció, roques filonianes i granit. Aquesta unitat es discordant sobre el Paleozoic. La seva potència ocsci la entre 325 i 350 m. S'interpreten com fàcies fluviovi·luvials de tipus trenat. Aquesta unitat es l'equivalent lateral de les unitats Pm, PElc i ECv, que afloren en el sector sud-oest del fuli, en el bloc inferior de la falla d'Amer. Grup Pontils. L'edat es atribuïble al Paleocè, Eocè inferior i probablement al Lutecià inferior.
- **ECv** Gresos mott fins i fins intercalitzats amb nivells de sorres i de conglomerats. A la mitat inferior de la unitat els nivells grollers tenen morfologia canaliforme amb potències d'ordre mètric a decamètric i són granodecreixents. A la mitat superior tenen una continuïtat lateral mott elevada i són d'ordre decimètric a mètric. A la vessant sud-oest de la cinglera del Far, a uns 25-30 metres del sostre de la unitat, s'identifiquen intercalacions de nivells calcaris granocoquinoides d'entre 2 i 3 metres de potència. Contenen oòlits, intraclasts, restes de bivalves i de gastròpodes. La seva potència es de 150 metres. S'interpreten com a fàcies fluviovi·luvials de tipus trenat, amb influència marina a la part superior. Fm. Vilanova de Sau. L'edat s'atribueix al Cuisià-Lutecià inferior.
- **PElc** Margues blau-grises i verdes, d'entre 1 i 2 metres de gruix intercalades amb capes decimètriques amalgamades de calcàries sorrenques i fàmic calcaris. Eis ultims metres del tram estan constituïts per nivells de calcàries marní-grises suportades per la matriu i granosuportades riques amb fang calcari, amb abundant fauna (miliòlids, alveolines, orbitoides i gastròpodes) i restes vegetals. Eis contactes inferior i superior son transicionals. La seva potència es de 20 metres. S'interpreten com a fàcies de plataforma mott restringida i sona. Fm. Orpí-Fm. Calé. S'atribueixen a l'Ònci inferior, llerdà.
- **Pm** Llims i sorres mott fines, intercalitzades amb nivells canaliformes de sorres heteromètriques immadures. El grui d'aquests nivells oscil·la entre 0,5 i 2 metres. La seva potència es de 30 metres. S'interpreten com a fàcies fluviovi·luvials proximals. Fm Mediona- Romagats. S'atribueixen al Paleocè.

Paleozoic

- **MC** **Carbonifer superior - Permià** *Hercinià*
  - *Gpgd* Cornaline porfídica. A la unitat CÒgp es forma biotita, agregats de miques mott altaret i a les zones mès properes a la intrusió granodiorítica (Ggd) es reconeixen porfiroblasts d'andalusita. Les textures son granoblàstiques, lepidoblàstiques i porfiroblàstiques. Metamorfisme de contacte hercinià associat a l'emplaçament de la granodiorita (Ggd).
  - *Ggd* Porfirs granodiorítics. Tenen textura porfírica amb fenocristalls mi·límetrics de plagioclasi, quars i en menor proporció biotita en una matriu de gra fi. Formen filons subverticals de direcció NE-SW i poden ferir una controlitat de centenars de metres. El grui es mott variable, d'ordre decamètric. Estan encaixats a les granodiorites (Ggd) i als materials de l'Ordovicià superior (Ord i Ordv), del Cambroordovicià (CÒgp) i eis gneis (Gnig). S'attribueixen a l'hercinià.
  - *Gnig* Granodiorites, i en menor proporció, granits i leucogranits. Presenten textura granellada de gra mitjà i gran. Com a minerals essencials tenen plagioclasi, feldspat potàssic, quars i biotita, en proporció variable. La presència d'andalusit (CÒgp) la que fa hagi variacions de la composició de la roca, que es pot donar fins i tot dins d'un mateix aflorament, a nivells, nombrosos enclaviats metamòrfics. Eis contactes son intrusius en la unitat CÒgp i estan intruïts pels diks de pòrfirs (Ggpd). Forma part del batòlit de Montseny-Guilleries. No es disposa de datacions absolutes i s'attribueixen a l'hercinià.
  - *MRac* Esquists, marbres i roques calcosilicatitzades de la zona de l'andalusita -cordierita. Eis i llistes de la unitat CÒgp esdevenen esquists amb moscovita, biotita i possiblement d'andalusita i possiblement de cordierita, que estan sempre alterats a sericita. Eis nivells calcaris (CÒc) estan totalment recristal·litzats i són marbres mott purs. Eis nivells calcosilicatats tenen piroxè, granat i epidota i presenten textures granoblàstiques. En el gneis leucocràtic (Gnig) es produeixen canvis texturals. Metamorfisme regional hercinià.

Ordovicià

- **Ord** **Ordovicià superior**
  Alternança de gresos i lutites gris-verdoses...les capes gresoses estan constituïdes per quars i feldspats. Tenen grunxos decimètrics i mètrics i s'organitzen en trams d'ordre decamètric. Esporàdicament presenten laminacions encreuades a petita escala, còdols tous, estructures de base i eics granodecreixents. La morfologia de les capes a escala de l'afloament es planoparal·lela. Localment s'intercalen capes de microconglomerats (c) suportats per la matriu amb còdols de quarsites i quars en una matriu lutítica. La potència aproximada es de 450 metres. S'interpreten com a dipòsits de plataforma interior detrítica. Al sud-oest de la localitat de Sant Climent d'Amer hi ha un jaciment fossilífer amb brequiòpodes (asprifers) datats del Caradòcià.
- **Ordv** Alternança de gresos quarsitebàptics i lutites amb nivells de conglomerats riques volcàniques àcides o intermèdies. Eis nivells de gresos quarsitebàptics estan mal classificats i tenen matriu pèlitica. Estan constituïts per grans de quars, sovint subidiomorfs i amb grafits de recristal·lització i per còdols de roques volcàniques. Eis nivells conglomeràtics estan constituïts per 10 metres i s'interpreten com a dipòsits derivats de roques volcàniques àcides o intermèdies. Eis conglomerats (c) constituïxen capes de gruix d'ordre mètric amb una continuïtat lateral que pot arribar a ser d'ordre centi-centenar de metres. Tenen una matriu pèlitica i la litologia dels còdols es fonamentalment quarsítica i amb menor proporció de quars. Localment es reconeixen nivells que poden interpretar-se com a volcànics. En conjunt aquesta unitat configura un vertical un cicle granodecreixent. El contacte inferior amb la unitat CÒgp es suposadament erosiu, i el superior amb la unitat Ord es transicional. El gruix total de la successió es aproximadament de 250 metres. S'attribueix a l'Ordovicià superior.

Cambroordovicià

- **CÒc** Calcàries i margues amb interfaces lutítics. L'estratificació és d'ordre decimètric i eis estrats presenten morfologies terminades ondulades. Formen un tram de 30-40 metres de gruix constituït per calcàries mott pures, nivells calcosilicatats (margues i margocalcàries) i lutites, mott transformades per l'efecte del metamorfisme regional hercinià (MRac). En aquest fuli no s'han reconegut nivells equivalents en zones no metamòrfiques. S'attribueixen al Cambroordovicià.
- **CÒgp** Alternança de gresos de gra fi i lutites. Les capes gresoses tenen grunxos centimètrics i formen sovint cicles granodecreixents. Presenten laminacions ondulades i laminacions encreuades a petita escala. Eis cicles de capes de gresos i lutites son generalment granodecreixents. Eis gresos son de gra fi i de color gris clar. Eis lutites son predominants i es presenten en capes de gruix mètric. La base de la successió es mètrica en un 20% i el 30%. Esporàdicament s'intercalen trams on el gruix de les capes gresoses es decimètric i predominen sobre eis nivells lutítics. A l'extrem meridional del fuli, aquesta unitat inclou una intercalació carbonatada (CÒc). El contacte inferior de la unitat al sector de Susqueda no aflora, i el superior amb la unitat Ordv es suposadament erosiu. Al sector meridional es troba per damunt del Gneis de les Guilleries (Gnig). La potència mínima es de 100 metres. Estan afectats pel metamorfisme regional (MRac). S'interpreten com a dipòsits de plataforma detrítica. Aquesta unitat està afectada pels processos de metamorfisme regional (MR) i de contacte (MC) hercinians. S'atribueix al Cambroordovicià.
- **Gnig** Gneis leucocràtic. Són mott massius, de gra mitjà i fi, i no presenten banda composicional clar, ni canvis mineralògics importants. Tenen textures granoblàstiques i estan constituïts principalment per grans de quars al·lotriomorfs i mott poca plagioclasi. El contacte amb la unitat suprajacent (CÒgp) es desconeix. Afloren en el sector sud del fuli, amb poca representació cartogràfica. La grosària mínima es de 100 metres. Estan afectats pel metamorfisme regional (MRac). S'interpreten com a ortogneis. No es disposa de datacions absolutes. Gneis de les Guilleries.

Mapa geològic

Escala 1: 25 000

500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 m

Esquema geològic

Produit per: © **Institut Cartogràfic de Catalunya** (ICC), Servei Geològic de Catalunya

Aquest document és protegit per la Llei. Es prohibeix qualsevol reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, si no ha estat expressament autoritzada per l'ICC.

Document de l'Institut Cartogràfic Central de Cartografia del Consejo Superior Geográfico.

Primera edició: novembre 1997

Dipòsit Legal: B. 49 144-97

Esquema estructural i de processos

Neogen? - Quaternari
Fallas normals en direcció NW-SE.

Hercinià? - Alpí? - Neogen?
Plecs de tipus kink band amb eixos subhoritzontals en direccions variades i plans axials subverticals.
Falles en direccions NW-SE que afecten eis materials paleozoics.

Hercinià
Metamorfisme de contacte (MC).
Intrusió dels filons de pòrfirs granític (Ggpd).
Intrusió de la granodiorita (Ggd) del batòlit de Montseny-Guilleries.
Metamorfisme regional (MR).
Sistema de plecs amb eixos subhoritzontals en direcció E-W, amb plans axials propers a l'horitzontal i de vergència sud, d'escala quilomètrica i amb clivatge associat.
Sistema de plecs amb eixos subhoritzontals en direcció NNE, amb plans axials subhoritzontals.
Emplaçament de roques ígnies leucocràtiques, probòlit del gneis de les Guilleries (Gnig).
Sedimentació dels materials de l'Ordovicià superior i vulcanisme.
Sedimentació dels materials del Cambroordovicià.

Unitats que no afloren a l'àmbit del full 295-1-2

SDel	Silurià-Devonià Full 295-2-2	Spn	Silurià Full 295-2-2	Pz	Paleozoic indiferenciat

Esquema de relacions estratigràfiques



Columnes sintètiques del Quaternari



Columna sintètica de l'Eocè



Columnes sintètiques del Paleozoic



Tall I-I'



Tall II-II'



Tall III-III'



Tall IV-IV'



Tall V-V'



Mapa geològic de Catalunya 1:25 000

Amer 295-1-2 (75-24)

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Institut Cartogràfic de Catalunya
Servei Geològic de Catalunya



Col·lecció 1:25 000

Direcció i coordinació del projecte:
Xavier Berástegui Batalla (SGC-ICC)
Mariona Lissarrague Bistach (SGC-ICC)

Autors:
Carme Puig i Civera (SGC-ICC), *Formació del fuli*
Emili Mató i Pallós, *Coordinació del fuli i geologia del Paleogen*
Eric Saula i Bretanó, *Geologia del Paleogen*
Joan Picart i Boira, *Geologia del Paleozoic*
Joan Solà i Subirana (Geoserve SCP), *Geologia del Quaternari*
Jordi Montanar i Rovira (Geoserve SCP), *Geologia del Quaternari*
Josep·maria Mallarach i Carrera, *Vulcanisme del Quaternari*
Josep Maria Sanuí i Elacòlli, *Micropaleontologia del Paleogen*
Josep Serra i Kiel (UB), *Micropaleontologia del Paleogen*

Geologia de camp del Paleozoic, del Paleogen i del Quaternari: 1992-1994
Geologia dels materials volcànics quaternaris: 1982-1986

Amb la col·laboració de:
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Signes convencionals

- Contacte concordant
- Contacte concordant suposat
- Contacte transicional
- Contacte discordant (al mapa)
- Contacte discordant (als talls)
- Contacte per escarpament
- Línia de capa
- Escarpament intraal·luvial
- Traça de l'estratificació (als talls)
- Contacte intrusiu
- Contacte intrusiu suposat
- Base de colada volcànica
- Base de colada volcànica suposada
- Cràter volcànic
- Flux de colada
- Límit d'aurèola de metamorfisme de contacte
- Terraplè en obra hidràulica
- Falla / Contacte mecànic
- Falla normal (bloc superior)
- Estructura suposada
- Estructura fossilitzada
- Eix sinclinal
- Traça de pla