Mapa geològic dels processos actius i recents i de l'activitat antròpica. Geoantròpic 1:25 000

Monistrol de Montserrat 392-1-1 (71-29)



MOSTRA GRATUÏTA A BAIXA RESOLUCIÓ. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya - www.icgc.cat, 2018 :: Fitxer digital georeferenciat GeoPDF en Sistema geodèsic de referència ETRS89 (el·lipsoide GRS80). Projecció cartogràfica UTM31 nord

Llegenda

ACTIVITAT ANTRÒPICA

- Límit de dipòsit antròpic
- Límit d'acció antròpica
- Escarpament antròpic

Terrenys antropitzats

Terrenys rebaixats (AR): Àrees on la superfície del terreny preexistent ha estat excavada artificialment.

- ARe — **Activitat extractiva.** Terreny rebaixat en el qual s'han dut a terme un conjunt d'operacions que tenen per finalitat l'obtenció de recursos naturals del subsòl, com ara àrids, pedra ornamental, etc. En l'àmbit del full, hi ha un cert nombre d'explotacions, actives i inactives, localitzades a les calcàrides fossilíferes de la unitat EBcm$_2$ i en els gresos de la unitat EBgm$_2$ del Mapa geològic revisat 1:25 000. Tant les calcàries com els gresos han estat explotats com a pedra per a la construcció; les calcàries s'han explotat, també, com a pedra ornamental.
- ARn — **Desmunt en vial i via ferria.** Terreny rebaixat en el qual s'emplaça un vial o una via ferria. En l'àmbit del full corresponen als rebaixos efectuats per al traçat de l'autopista C-16, de les carreteres C-55 i C-58, dels Ferrocarrils de la Generalitat de la línia Barcelona – Manresa i de la línia de Rodalies de Renfe R4 Sant Vicenç de Calders – Manresa; a més dels rebaixos del cremallera i de l'aeri de Montserrat.

Terrenys terraplenats o reblets (AT): Àrees on s'ha disposat material artificialment sobre la superfície del terreny preexistent.

- ATa — **Abocador.** Inclou totes aquelles àrees on es deposen residus, com ara escombraries, runa, etc. En l'àmbit del full, només hi ha un dipòsit controlat de residus, el qual és situat al terme municipal de Vacarisses.
- ATbt — **Abassegament temporal.** Terreny en el qual hi ha hagut aportacions artificials de material generats durant una obra, els quals es reutilitzen en la mateixa obra o en obres posteriors.
- ATv — **Terraplè en vial i via ferria.** Terreny terraplenat o rebleri en el qual s'emplaça un vial o una via ferria. En l'àmbit del full corresponen als terraplens efectuats per al traçat de l'autopista C-16, de les carreteres C-55 i C-58, dels Ferrocarrils de la Generalitat de la línia Barcelona – Manresa i de la línia de Rodalies de Renfe R4 Sant Vicenç de Calders – Manresa; a més dels terraplens del cremallera i de l'aeri de Montserrat.

Terrenys modificats o remodelats (AM): Àrees on la superfície preexistent del terreny ha estat severament modificada per l'acció humana, de manera que no és possible de diferenciar de forma precisa les zones rebaixades i les zones rebaixades.

- AMr — **Planta de tractament de residus.** Instal·lació destinada al tractament de residus i aigües residuals per tal de modificar-ne les característiques físiques o químiques i facilitar-ne la disposició. En l'àmbit del full, correspon a la planta de tractament situada al sud de la població de Monistrol de Montserrat.
- AMx — **Explanació per obra viària i ferroviària.** Inclou totes aquelles àrees on s'ha dut a terme alguna actuació en el terreny, diferent d'un terraplè o rebaix, per a l'emplaçament d'un vial o una via ferria. En l'àmbit del full corresponen als terraplens sobre els quals s'emplacen l'autopista C-16, la carretera C-55 i la carretera C-58.
- AMzi — **Zona industrial.** Delimitació no administrativa d'una zona urbanitzada on s'agrupen activitats industrials i de serveis no residencials.
- AMzu — **Zona urbana.** Delimitació no administrativa de la zona que inclou tot aquells elements urbanístics destinats al servei de la població, com són edificacions, carrers, parcs, etc. S'inclouen les instal·lacions d'ús públic (hospitals, presons, etc) desvinculades del nucli urbà, així com les urbanitzacions.

Elements antròpics

Poblament

- Edificació
- Piscina

Xarxa viària

- Autopista
- Via preferent
- Carretera convencional
- Túnel de carretera convencional
- Carretera comarcal
- Túnel de carretera comarcal
- Carretera local
- Pont, viaducte
- Vial pavimentat
- Túnel de vial pavimentat
- Camí
- Túnel de camí
- Corriol
- Obres: Tram en construcció
- Ferrocarril
- Túnel de ferrocarril
- Pati de vies de ferrocarril
- Cremallera, funicular
- Túnel de cremallera, de funicular
- Teleféric

Obres hidràuliques

- Basse o dipòsit descobert
- Resclosa
- Canal i séquia
- Mur de contenció

Energies i serveis

- Línia elèctrica
- Torre elèctrica
- Conducció

Forestal

- Tallafocs

PROCESSOS I FORMACIONS SUPERFICIALS NATURALS

- Límit definit
- Límit incert
- Límit gradual

Dinàmica fluvial, fluvial-al·luvial, fluviotorrencial i al·luvial-col·luvial (F, FA, FT i AC)

Àrees funcionals

Àmbit d'erosió

- FTx5 — **Zones d'alxaragallament actiu.** Comprenen les zones actualment afectades per una intensa erosió hídrica superficial i subsuperficial, amb presència generalitzada de xarugalls profunds i molt atapeïts. Es localitzen sobre litologies d'elevada erosionabilitat. En l'àmbit del full, es troben afectant els materials margosos de les unitats EBlm$_3$ i EBcm$_1$ del Mapa geològic revisat 1:25 000.
- FTx6 — **Zones de xaragalls parcialment estabilitzats per la vegetació i per dipòsits de vessant.** Es localitzen fonamentalment sobre litologies d'elevada erosionabilitat. En l'àmbit del full, es troben afectant els materials margosos de les unitats EBlm$_3$ i EBcm$_1$ del Mapa geològic revisat 1:25 000.
- Curs fluvial dominat per processos d'incisió lineal
- Escarpament en roca generat per erosió lateral d'alçada inferior a 10 m que genera despreniments. L'acció de l'erosió del curs fluvial, mitjançant el socavament de marges en meandres o traçats sinuosos, dóna lloc a escarpaments de despreniments.
- Escarpament en roca generat per erosió lateral d'alçada compresa entre 10 i 100 m que genera despreniments. L'acció de l'erosió del curs fluvial, mitjançant el socavament de marges en meandres o traçats sinuosos, dóna lloc a escarpaments de despreniments.
- Escarpament en substrat tou generat per erosió lateral d'alçada inferior a 10 metres que genera despreniments. L'acció de l'erosió del curs fluvial, mitjançant el socavament de marges en meandres o traçats sinuosos, dóna lloc a escarpaments de despreniments en roca tova.
- Escarpament en substrat tou generat per erosió lateral d'alçada compresa entre 10 i 100 metres que genera desprenimentos. L'acció de l'erosió del curs fluvial, mitjançant el socavament de marges en meandres o traçats sinuosos, dóna lloc a escarpaments de despreniments en roca tova.

Àmbit de transport-sedimentació

- Curs fluvial dominat per processos de transport-sedimentació
- Flla — **Llits actuals.** Corresponen als llits de rius i rieres principals que actuen en l'actualitat, el Llobregat, la Riera de Marganell, la Riera de Rellinars i la Riera del Palà. Els processos dominants són el transport i la sedimentació. Presenten dipòsits de grau irregular, que poden arribar fins a 3 metres, constituïts per graves i graves amb matriu sorrenca. Formen part de les zones inundables segons criteris geomorfològics. Es tracta de dipòsits no consolidats, excavables. Agrupa les unitats cartogràfiques Qt$_0$ i Qa$_1$ del Mapa geològic revisat 1:25 000.
- FAva — **Cons de dejecció actius.** Es tracta de dipòsits que es desenvolupen a les parts distals de canals de despreniments. A l'àmbit del full, es localitzen a les parts distals del torrent de la Font del Boix i de la Canal del Morro. Al Torrent de Santa Maria hi ha dipòsits de mida no cartografiable. Els dipòsits d'aquesta unitat són formats per sorres argiloses que engloben clòdols i blocs heteromètrics. Es tracta de materials no consolidats d'edat actual. Tenen una potència d'escala mètrica. Corresponen a la unitat cartogràfica Qcd$_0$ del Mapa geològic revisat 1:25 000. Formen part de les zones inundables segons criteris geomorfològics.

Àmbit de transport-sedimentació

- Fll — **Terrasses baixes i mitjanes.** Són dipòsits, topogràficament elevats respecte al nivell de base actual, d'antics llits fluvials. Litològicament, són constituïts per graves i graves amb matriu sorrenca. Presenten clasts de naturalesa local, generalment subarrodonits i fortament imbricats i quars. Formen nivells de capes tabulars o acanalades de gruix centimètric o mètric, de gran continuïtat lateral. El gruix total pot assolir 700 m. Aquests nivells donen lloc a escarpaments i vessants generadors de despreniments que poden assolir alçades superiors a 100 m. Es troben força disclasats, amb dues direccions principals del disclasatge, NNE–SSO i ONO–ESE. Aquest fet afavoreix el desenvolupament d'aguiles i pinacles, d'alçades decamètriques i hectomètriques, característics del massís de Montserrat; l'existència de sectors on la matriu és menys cimentada i l'efecte de l'acció de l'aigua meteòrica, produeix diagregacions i trencaments de la roca per tal de generar desprenimentos de grans dimensions que arriben a 100 m^3. En conjunt, aquesta unitat es troba força carstificada, i s'hi ha desenvolupat un endocarst important que es manifesta per la presència de cavitats i surgències. Constitueixen roques de gran duresa, no ripables. Aquests conglomerats són la litologia dominant al massís de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt. Corresponen a les unitats EBcc$_1$, EBcm$_1$, EPcm$_1$ i als nivells conglomeràtics de la unitat ECLgb situats a base i sostre de la unitat ECLgb del Mapa geològic 1:25 000 revisat. S'atribueixen al Paleogen.
- Fll — **Llits actuals.** Corresponen als llits de rius i rieres principals que actuen en l'actualitat, el Llobregat, la Riera de Marganell, la Riera de Rellinars i la Riera del Palà. Els processos dominants són el transport i la sedimentació. Presenten dipòsits de grau irregular, que poden arribar fins a 3 metres, constituïts per graves i graves amb matriu sorrenca. Formen part de les zones inundables segons criteris geomorfològics. Es tracta de dipòsits no consolidats, excavables. Agrupa les unitats cartogràfiques Qt$_0$ i Qa$_1$ del Mapa geològic revisat 1:25 000.
- FAva — **Cons de dejecció actius.** Es tracta de dipòsits que es desenvolupen a les parts distals de canals de despreniments. A l'àmbit del full, es localitzen a les parts distals del torrent de la Font del Boix i de la Canal del Morro. Al Torrent de Santa Maria hi ha dipòsits de mida no cartografiable. Els dipòsits d'aquesta unitat són formats per sorres argiloses que engloben clòdols i blocs heteromètrics. Es tracta de materials no consolidats d'edat actual. Tenen una potència d'escala mètrica. Corresponen a la unitat cartogràfica Qcd$_0$ del Mapa geològic revisat 1:25 000. Formen part de les zones inundables segons criteris geomorfològics.

Àrees no funcionals

Àmbit de transport-sedimentació

- Fll — **Terrasses baixes i mitjanes.** Són dipòsits, topogràficament elevats respecte al nivell de base actual, d'antics llits fluvials. Litològicament, són constituïts per graves i graves amb matriu sorrenca. Presenten clasts de naturalesa local, generalment subarrodonits i fortament imbricats i quars. Formen nivells de capes tabulars o acanalades de gruix centimètric o mètric, de gran continuïtat lateral. El gruix total pot assolir 700 m. Aquests nivells donen lloc a escarpaments i vessants generadors de despreniments que poden assolir alçades superiors a 100 m. Es troben força disclasats, amb dues direccions principals del disclasatge, NNE–SSO i ONO–ESE. Aquest fet afavoreix el desenvolupament d'aguiles i pinacles, d'alçades decamètriques i hectomètriques, característics del massís de Montserrat; l'existència de sectors on la matriu és menys cimentada i l'efecte de l'acció de l'aigua meteòrica, produeix diagregacions i trencaments de la roca per tal de generar desprenimentos de grans dimensions que arriben a 100 m^3. En conjunt, aquesta unitat es troba força carstificada, i s'hi ha desenvolupat un endocarst important que es manifesta per la presència de cavitats i surgències. Constitueixen roques de gran duresa, no ripables. Aquests conglomerats són la litologia dominant al massís de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt. Corresponen a les unitats EBcc$_1$, EBcm$_1$, EPcm$_1$ i als nivells conglomeràtics de la unitat ECLgb situats a base i sostre de la unitat ECLgb del Mapa geològic 1:25 000 revisat. S'atribueixen al Paleogen.
- FAvi — **Ventalls al·luvials inactius.** Són formats per graves i graves amb intercalacions de nivells de sorres i llims ocres. Tenen grunsols d'entre metric. Es tracta de materials no consolidats del Plistocè superior. Corresponen a la unitat cartogràfica Qv$_4$ del Mapa geològic revisat 1:25 000.
- ACi — **Dipòsits de gènesi col·luvial i col·luvial-al·luvial.** Són constituïts per argiles i llims de color vermellós i ocre, A la base, incorporen nivells canaliformes de graves i graves amb matriu llimosa que, en alguns casos, són lleugerament cimentades. Assoleixen gruixos màxims de 10 metres. Són materials no consolidats de l'Holocè. Corresponen a les unitats cartogràfiques Qac$_1$, Qac$_0$, Qac$_1$ i Qac$_0$ del Mapa geològic revisat 1:25 000.

Dinàmica dels moviments de vessant (Esllavissades) (ED)

DESPRENIMENTS

Àrees funcionals

Zones de sortida

- EDv — **Vessant generador de despreniments.** Són vessants de pendent superior a 45° amb presència d'indicadors morfològics de despreniments.
- EDvbd10 — **Vessant de duresa heterogènia generador de despreniments i/o bolcades on s'acumulen blocs calguts de mida modal entre 1 i 10 m³.** Es tracta de vessants amb pendent compris entre 20 i 45° generats sobre una substrat constituït per una alternança de capes dures i toves. Les capes dures formen escarpaments generadors de despreniments d'alçades inferiors a 10 metres. El pendent modelat del vessant afavoreix que els blocs despresos tinguin poc desplaçament i s'acumulin formant un tapís de blocs dispersos a sobre del vessant. Els blocs són de mida modal entre 1 i 10 m³, tot i que, puntualment, es despresen blocs de mida modal superior a 10 m³.
- EDvbd100 — **Vessant de duresa heterogènia generador de despreniments i/o bolcades on s'acumulen blocs calguts de mida modal entre 10 i 100 m³.** Es tracta de vessants amb pendent compris entre 20 i 45° generats sobre una substrat constituït per una alternança de capes dures i toves. En general, a l'àmbit del full, les capes dures formen escarpaments generadors de despreniments d'alçades compreses entre 10 i 20 m. El pendent moderat del vessant afavoreix que els blocs despresos tinguin poc desplaçament i s'acumulin formant un tapís de blocs dispersos a sobre del vessant. Els blocs són de mida modal entre 10 i 100 m³.
- EDa10 — **Àrea d'aguiles generadores de despreniments d'alçada compresa entre 10 i 100 m.** Són àrees que presenten una densitat elevada d'aguiles i pinacles d'alçada compresa entre 10 i 100 m. Els despreniments que es generen són de mida molt variable, des de mida còdol fins a blocs d'ordre decamètric. Al full, aquestes àrees es localitzen al massís de Montserrat; la majoria d'aguiles són conegudes i es denominen per les formes que dibuixen.
- Escarpament generador de despreniments en substrat de roca dura d'alçada inferior a 10 metres
- Escarpament generador de despreniments en substrat de roca dura d'alçada compresa entre 10 i 100 metres
- Escarpament generador de despreniments en substrat de roca dura d'alçada superior a 100 metres
- Cresta generadora de despreniments en substrat de roca dura d'alçada inferior a 10 metres
- Cresta generadora de despreniments en substrat de roca dura d'alçada compresa entre 10 i 100 metres
- Cresta generadora de despreniments en substrat de roca dura d'alçada superior a 100 metres
- Cresta generadora de despreniments en substrat de roca dura amb escarpaments d'alçada variable; un d'alçada compresa entre 10 i 100 metres, l'altre, d'alçada inferior a 10 metres
- Cresta generadora de despreniments en substrat de roca dura amb escarpaments d'alçada variable; un d'alçada superior a 100 metres, l'altre, entre 10 i 100 metres
- Escarpament generador de despreniments en substrat de roca tova d'alçada inferior a 10 metres
- Aguila generadora de despreniments d'alçada compresa entre 10 i 100 metres
- Aguila generadora de despreniments d'alçada superior a 100 metres
- Canal de desprenimients en substrat rocós. Zona preferent de pas de despreniments
- Cicatriu de caiguda de bloc recent.

Zones d'arribada

- EDepc — **Esbaldregalls de pendent coberts per vegetació.** Dipòsit d'esbaldregalls de graves angulars i blocs heteromètrics envoltats per una matriu de sorra argilosa. A sobre del dipòsit hi ha vegetació arbòria o arbustiva. En alguns casos, a la part distal, hi ha desenvolupat un sòl edàfic. La presència de vegetació arbòria o de sòl edàfic indica que el seu grau d'activitat és baix. Sobre el dipòsit s'identifiquen blocs rocosos dispersos de mides mitjana variables, des d'1 m³ fins a blocs de més de 100 m³.
- EDbd10 — **Blocs rocosos dispersos de mida modal entre 1 i 10 m³.** Es troben de forma allada i inconnexa damunt d'un substrat no relacionat amb despreniments.
- **Bloc caigut allat antic de volum entre 1 i 10 m³.** La caiguda del bloc no es pot relacionar amb vegetació arbòria malmesa, ni es disposa de referències documentals ni testimonials de l'esdeveniment.
- **Bloc caigut allat antic de volum entre 10 i 100 m³.** La caiguda del bloc no es pot relacionar amb vegetació arbòria malmesa, ni es disposa de referències documentals ni testimonials de l'esdeveniment.
- **Bloc caigut allat antic de volum superior a 100 m³.** La caiguda del bloc no es pot relacionar amb vegetació arbòria malmesa, ni es disposa de referències documentals ni testimonials de l'esdeveniment.
- **Bloc caigut allat recent de volum entre 1 i 10 m³.** El bloc ha caigut en les darreres dècades. Acostuma a ser relacional amb vegetació arbòria malmesa per l'impacte del bloc, o bé es disposa de referències documentals i/o testimonials de l'esdeveniment.
- **Bloc caigut allat recent de volum entre 10 i 100 m³.** El bloc ha caigut en les darreres dècades. Acostuma a ser relacional amb vegetació arbòria malmesa per l'impacte del bloc, o bé es disposa de referències documentals i/o testimonials de l'esdeveniment.

Dinàmica càrstica (C)

Àrees funcionals

Àmbit d'erosió-denudació

- Ccs_cg — **Àrees càrstiques desenvolupades en formacions de conglomerats carbonàtics.** Són àrees amb permeabilitat per fracturació i/o carstificació superficials que constitueixen les àrees de recàrrega dels principals aqüífers càrstics. En l'àmbit del full, les dues principals àrees amb carstificació en conglomerats són el massís de Montserrat i el massís de Sant Llorenç del Munt. En aquestes zones, malgrat que els fenòmens d'excavació són escassos, s'hi ha desenvolupat un important endocarst que es manifesta per l'existència de nombroses cavitats i surgències importants. En la gènesi de les aiguilles i pinacles, característiques del massís de Montserrat, a més de fenòmens relacionats amb erosió hídrica i amb fenòmens de despreniments, és possible que hi hagi tingut un paper rellevant la dissolució del cartonat de calci en plans de diàclasis. Corresponen a les unitats EBcm, EPcm i EBcc del Mapa geològic revisat 1:25 000.
- Ccs_cs — **Àrees càrstiques desenvolupades en formacions carbonàtiques.** Són àrees amb permeabilitat per fracturació i/o carstificació superficials que constitueixen les àrees de recàrrega dels principals aqüífers càrstics. En l'àmbit del full, només hi ha un petit afloriment, al límit SE, que correspon a la unitat Tm$_3$ del Mapa geològic revisat 1:25 000. Aquesta unitat es troba més representada als fulls d'Olesa de Montserrat (392-1-2) i Castellar del Vallès (392-2-1).
- Avenc
- Cova

Àmbit de transport-sedimentació. Zones de descàrrega actives

- Surgència càrstica permanent
- Surgència càrstica intermitent
- Avenc amb surgència intermitent
- Cova amb surgència intermitent

Àrees no funcionals

Àmbit de transport-sedimentació. Zones de descàrrega inactives

- Ctr — **Calcàries travertíniques.** Són calcàries travertíniques amb nivells clàstics alternants. Els nivells detrítics tenen una potència de decimètrica a mètrica i són constituïts per litres arrencats amb còdols dispersos i nivells de graves. La unitat té un gruix irregular que va des de centimètric fins a decimètric, amb una potència màxima de 12 metres. Es distingueixen tres complexos travertínics situats a diferents alçades del llit actual de la Riera de Rellinars. Corresponen a les unitats cartogràfiques Qtr$_1$, Qtr$_2$ i Qtr$_3$ del Mapa geològic revisat 1:25 000. La seva edat s'atribueix al Plistocè superior - Holocè.

Elements antròpics

Poblament

- Edificació
- Piscina

Xarxa viària

- Autopista
- Via preferent
- Carretera convencional
- Túnel de carretera convencional
- Carretera comarcal
- Túnel de carretera comarcal
- Carretera local
- Pont, viaducte
- Vial pavimentat
- Túnel de vial pavimentat
- Camí
- Túnel de camí
- Corriol
- Obres: Tram en construcció
- Ferrocarril
- Túnel de ferrocarril
- Pati de vies de ferrocarril
- Cremallera, funicular
- Túnel de cremallera, de funicular
- Teleféric

Obres hidràuliques

- Basse o dipòsit descobert
- Resclosa
- Canal i séquia
- Mur de contenció

Energies i serveis

- Línia elèctrica
- Torre elèctrica
- Conducció

Forestal

- Tallafocs

Escala **1: 25 000**

500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 m

Convergència de la quadrícula a= 2° 42' 57,67" W

Valor mitjà de la declinació magnètica el juny de 2011: d: 9° 31' 55,99" E

Variació anual: 0° 8' 12,86" E

Dades referides al centre del full

El·lipsoide de Hayford. Datum Europeu. Longituds referides al meridià de Greenwich. Altituds referides al nivell mitjà del mar a Alacant. Projecció UTM. Equidistància de les corbes de nivell: 10 metres.

NP: nord de la projecció
NM: nord magnètic
NG: nord geogràfic



© Base temàtica: **Institut Geològic de Catalunya** (IGC)
© Base altimètrica i planimètrica: BTC25m **Institut Cartogràfic de Catalunya** (ICC)

Aquest document és protegit per la Llei. Es prohibeix qualsevol reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, si no ha estat expressament autoritzada per l'IGC i l'ICC.

Produït per: © **Institut Geològic de Catalunya** (IGC) © **Institut Cartogràfic de Catalunya** (ICC)

Edició i publicació: © **Institut Cartogràfic de Catalunya** (ICC)

Primera edició: juliol 2011 — Data de vol planimetria: juny 2008 — Dipòsit Legal: B. 29 854-2011

Institut Cartogràfic de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Balmes 209-213 – 08006 Barcelona
Tel. 93 567 15 00 – Fax 93 567 15 62
http://www.icgc.cat
1a edició: juliol 2011



Mapa geològic de Catalunya
Geotreball II. Mapa geoantròpic
Monistrol de Montserrat
392-1-1 (71-29)
1:25 000

Agrupacions litològiques i elements estructurals 1:50 000

Llegenda

Sediments

Predominí de blocs

- Bl_Q — **Blocs heteromètrics i greves.** Blocs d'ordre de mètric a decamètric, i greves provinents de la disgregació del massís de Montserrat (unitats EPcm, EBcm i EBlg, del Mapa geològic 1:25 000 revisat). Els blocs i les greves es troben englobats en una matriu de sorres i llims. L'estructura interna del dipòsit és caòtica. El gruix és molt variable, però en general és d'ordre mètric. Corresponen a dipòsits d'esbaldregalls de pendent al peu dels escarpaments del vessant nord del massís de Montserrat. Majoritàriament, són dipòsits d'aquesta edat, tot i que també n'hi ha de més antics. Són dipòsits no consolidats i excavables. Comprèn les unitats Qepg i Qdp del Mapa geològic 1:25 000 revisat. Són del Quaternari.

Predominí de greves

- Gv_Q — **Greves i graves amb matriu sorrenca.** Els materials més fins se situen cap al sostre de la unitat, amb presència de llims argilosos amb algunes fàsies lenticulars de greves. En conjunt formen dipòsits granodecreixents. Corresponen a dipòsits fluvials i dipòsits de vertall al·luvial del Llobregat, de les rieres de Marganell i de Castellet, i dels seus afluents principals. La potència és variable; les unitats que corresponen a dipòsits de terrassa van des d'1 metre (les més modernes) fins a 10 metres (les més antigues) mentre que les corresponents a vertalls al·luvials poden assolir els 10 metres de gruix. Són dipòsits no consolidats, fàcilment excavables. Corresponen a les unitats Qt$_0$, Qv$_1$, Qv$_2$, Qv$_3$, Qv$_4$ i Qv$_5$ del Mapa geològic 1:25 000 revisat. Són del Quaternari.

Predominí d'argiles i llims

- Ag_Q — **Argiles i llims.** Són argiles i llims de color vermellós i ocre. A la base, incorporen nivells canaliformes de graves i graves amb matriu llimosa que, en alguns casos, són lleugerament cimentades. Cap a sostre incorporen algunes intercalacions de nivells de sorres, i poden presentar concrecions de carbonat calci nodulars i tabulars. S'interpreten com a dipòsits mixts al·luvials-col·luvials de les rieres principals. La potència varia d'1 a 10 metres. Són materials no consolidats o parcialment consolidats, excavables. Comprèn les unitats Qac$_1$, Qac$_0$, Cac$_1$, Qac$_1$ i Qcd$_0$ del Mapa geològic 1:25 000 actualitzat. Són del Quaternari.

Roques sedimentàries

Bretxes i conglomerats

- Br_P — **Bretxes.** Formen dipòsits massius constituïts per nivells de bretxes amb fines intercalacions de gresos i lutites. Les bretxes es disposen en capes centimètriques o decimètriques de morfologia planar. En conjunt, són constituïdes per una matriu sorrenca o argilosa rica en clasts calcàrics. Els clasts són heteromètrics, estan seleccionats i poden ser cimentats. Llur litologia és principalment de calcàries mesozoiques, i en menor proporció de roques metasedimentàries i ígnies paleozoiques, gresos triàsics i quars. El gruix del dipòsit és d'uns 750 metres. Aquestes bretxes constitueixen roques consolidades, amb gran duresa i generalment no ripables. Corresponen al les unitats EBbh, EBbmp, EBbp i ECbc del Mapa geològic 1:25 000 revisat. Són del Paleogen.
- Cg_P — **Conglomerats massius.** Són conglomerats heteromètrics clastosuportats amb matriu gresosa i lutítica, molt ben cimentats. La composició dels clasts és majoritàriament de calcàries, i en menor proporció de roques metasedimentàries i ígnies paleozoiques, gresos triàsics i quars. Formen nivells de capes tabulars o acanalades de gruix centimètric o mètric, de gran continuïtat lateral. El gruix total pot assolir 700 m. Aquests nivells donen lloc a escarpaments i vessants generadors de despreniments que poden assolir alçades superiors a 100 m. Es troben força disclasats, amb dues direccions principals del disclasatge, NNE–SSO i ONO–ESE. Aquest fet afavoreix el desenvolupament d'aguiles i pinacles, d'alçades decamètriques i hectomètriques, característics del massís de Montserrat; l'existència de sectors on la matriu és menys cimentada i l'efecte de l'acció de l'aigua meteòrica, produeix diagregacions i trencaments de la roca per tal de generar desprenimentos de grans dimensions que arriben a 100 m^3. En conjunt, aquesta unitat es troba força carstificada, i s'hi ha desenvolupat un endocarst important que es manifesta per la presència de cavitats i surgències. Constitueixen roques de gran duresa, no ripables. Aquests conglomerats són la litologia dominant al massís de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt. Corresponen a les unitats EBcc$_1$, EBcm$_1$, EPcm$_1$ i als nivells conglomeràtics de la unitat ECLgb situats a base i sostre de la unitat ECLgb del Mapa geològic 1:25 000 revisat. S'atribueixen al Paleogen.

Gresos

- Gs_P — **Gresos.** Són gresos massius de color gris i vermell. En general són de gra que va de molt fi a molt gruixer. A la part alta de la unitat, presenten intercalacions de nivells decimètrics o mètrics de conglomerats i lutites carbonàtiques, i a la part baixa, intercalacions decimètriques de calcàries de color gris, i lutites i gresos de colors liles i vermellosos. La potència és de 180 m. Tenen un gruix d'erosionabilitat superior al dels conglomerats (Cg_P). En el paisatge, aquesta unitat, juntament amb la unitat CgGsLu_P, es caracteritzen per ser una alternança mètrico-decamètrica de nivells tous i durs que, sovint, presenten un talús de bloc disposat desplomat. Aquest fet afavoreix que es generen sòls de mida còdol. Molt localment, presenten ferogines d'endurament poc desenvolupat. Són dipòsits consolidats, no ripables. Els gresos de la unitat EBlgm$_2$ han estat i són explotats com a pedra per a la construcció. Corresponen a les unitats EBgm$_1$, EBgm$_2$, EBglc i als nivells de turbidites (t) de EBlmp del Mapa geològic 1:25 000 revisat. Són del Paleogen.

Margues

- Mg_P — **Margues.** Són margues o lutites carbonàtiques de color gris blavós. S'intercalen, a base i a sostre, amb els gresos, margues i calcàries de les unitats EBgm$_1$, EBcm$_2$ i EBgm$_2$ del Mapa geològic 1:25 000 revisat. La potència aflorant de la unitat varia, en general, de 80 a 120 m. Sovint, aquesta unitat es troba afectada per processos d'erosió hídrica que donen lloc a morfologies de xaragalls. En general, es tracta de materials consolidats o mitjanament consolidats ripables; localment, poden ser no ripables. Corresponen a les unitats EBlm$_1$, EBlm$_2$ del Mapa geològic 1:25 000 revisat. Són del Paleogen.

Calcàries

- Tr_Q — **Calcàries travertíniques.** Són calcàries travertíniques micrítiques ocres amb intercalacions de nivells detrítics. Les calcàries presenten estratificació subhoritzontal, que varia entre centimètrica i decimètrica, amb abundants restes atribuïbles a tiges calcificades i ocasionalment restes de gasteròpodes. Els nivells detrítics són constituïts per llims arenosos color ocre amb clasts de naturalesa local. Tenen una potència de decimètrica a centimètrica. En conjunt s'interpreten com a dipòsits lacustres amb precipitació de carbonat que presenten influències al·luvials. El gruix d'aquests dipòsits oscil·la entre 5 i 12 metres. Localment poden ser massives per haver sofert processos de carstificació i posterior precipitació de carbonat càlcic. Es localitzen a la Riera de Rellinars. Són roques majoritàriament ripables. Comprèn les unitats Qtr$_1$, Qtr$_2$ i Qtr$_3$ del Mapa geològic 1:25 000 revisat. Són del Quaternari.

- Cg_P — **Conglomerats massius.** Són conglomerats heteromètrics clastosuportats amb matriu gresosa i lutítica, molt ben cimentats. La composició dels clasts és majoritàriament de calcàries, i en menor proporció de roques metasedimentàries i ígnies paleozoiques, gresos triàsics i quars. Formen nivells de capes tabulars o acanalades de gruix centimètric o mètric, de gran continuïtat lateral. El gruix total pot assolir 700 m. Aquests nivells donen lloc a escarpaments i vessants generadors de despreniments que poden assolir alçades superiors a 100 m. Es troben força disclasats, amb dues direccions principals del disclasatge, NNE–SSO i ONO–ESE. Aquest fet afavoreix el desenvolupament d'aguiles i pinacles, d'alçades decamètriques i hectomètriques, característics del massís de Montserrat; l'existència de sectors on la matriu és menys cimentada i l'efecte de l'acció de l'aigua meteòrica, produeix diagregacions i trencaments de la roca per tal de generar desprenimentos de grans dimensions que arriben a 100 m^3. En conjunt, aquesta unitat es troba força carstificada, i s'hi ha desenvolupat un endocarst important que es manifesta per la presència de cavitats i surgències. Constitueixen roques de gran duresa, no ripables. Aquests conglomerats són la litologia dominant al massís de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt. Corresponen a les unitats EBcc$_1$, EBcm$_1$, EPcm$_1$ i als nivells conglomeràtics de la unitat ECLgb situats a base i sostre de la unitat ECLgb del Mapa geològic 1:25 000 revisat. S'atribueixen al Paleogen.
- CaSc_Tr — **Calcàries i dolomies.** Aquesta unitat engloba un conjunt litològic, de composició carbonàtica, format majoritàriament per calcàries, dolomies, i brèixes carbonàtiques de color gris i ocre. Les calcàries i les dolomies es troben en capes centimètriques o decimètriques, de vegades laminades per processos de carstificació. Aflora de manera molt restringida a l'extrem sud-oest del full, limitada per falles. La unitat es troba més ben representada als fulls d'Olesa de Montserrat (392-1-2) i de Castellar del Vallès (392-2-1). Són roques molt consolidades i no ripables. Fàcies Muschelkalk superior. Corresponen a la unitat Tm$_3$ del Mapa geològic 1:25 000 actualitzat. Són del Triàsic.

Unitats compostes heterogènies

- CgGsLu_P — **Gresos i lutites amb intercalacions de conglomerats.** En conjunt, la unitat és constituïda per una alternança de nivells de gresos i lutites, que presenta intercalacions de nivells de conglomerats vermells. Els gresos són de color vermell i formen nivells de gruix de mètric a decamètric amb morfologia de capes tabulars. Les lutites són de color vermell i liles i tenen gruixos decimètrics a mètrics. La granulometria dels gresos va de gra molt fi a molt gruixer. Les lutites són d'estructura massiva de color vermell i lila. En el tram mitjà de la unitat, les lutites assoleixen 20 m de gruix i presenten intercalacions de calcàries grises de fins a 2 m de potència. Els conglomerats formen nivells de gruix centimètric i mètric ben cimentats; són granosuportats amb matriu; la composició dels clasts és majoritàriament de calcàries triàsiques i en menor proporció de roques metamòrfiques i ígnies paleozoiques, gresos triàsics i quars. El gruix mínim estimat de la unitat és de 825 m. Aquesta unitat i la unitat Gs_P es caracteritzen per donar un relleu de capes alternants de potència mètrico-decamètrica de nivells tous i durs que, sovint, presenten un talús de bloc disposat desplomat dels nivells de gresos i conglomerats (EDvbd10, EDvbd100). Són materials consolidats i generalment, no ripables. Corresponen a la unitat ECLgb i EBlg del Mapa geològic 1:25 000 revisat. Són del Paleogen.
- CaMg_P — **Calcàries i margues.** Es tracta d'una alternança de calcàries i lutites carbonàtiques o margues. Les calcàries són majoritàriament granosuportades amb matriu micrítica. Formen nivells de gruix centimètric a mètric que, localment, presenten abundant contingut fossilífer. Els nivells margosos són de color gris blavós, i tenen intercalacions de gresos i conglomerats de gruix mètric. En conjunt, la unitat pot formar trams d'ordre decamètric que s'intercalen lateralment amb les unitats EBgm$_2$ i EBlmp del mapa revisat 1:25 000. Localment, aquesta unitat es troba afectada per processos d'erosió hídrica que donen lloc a morfologies de xaragalls. Es tracta de litologies de moderadament consolidades a consolidades, en general, ripables. Les calcàries fossilíferes són explotades com a pedra ornamental per a la construcció. Corresponen a la unitat EBcmy del Mapa geològic 1:25 000 revisat. Són del Paleogen.

Roques ígnies

Roques volcàniques

- Ris_O — **Riolitoides.** Són roques leucocràtiques de textura porfírica amb fenocristalls de quars i i feldespat inclosos en una matriu de gra fi. Localment, presenten intercalacions, de pissarres, fil·lites, dacites i gresos quarsifeldspàtics vulcanoderivats. En aquest full, el gruix estimat és de 150 metres. El conjunt de roques englobades en la unitat presenta un clivatge original pel la deformació varisca. Són materials no ripables. Corresponen a la unitat Orva del Mapa geològic 1:25 000 revisat. Són roques de l'Ordovicià afectades, durant el Carbonífer, per la deformació i pel metamorfisme de baix grau, associats a l'Orogènia Varisca.

Roques metamòrfiques

Roques foliades

- Pis_O — **Pissarres.** Són roques pelítiques que presenten una foliació marcada. La unitat integra una successió formada per intercalacions d'ordre centimètric de lutites i gresos, amb nivells decimètrics de roques i dacites. El conjunt de roques que formen l'agrupació presenta un clivatge mol